

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM

ODSTRANĚNÍ GENITÁLNÍCH BRADAVIC

Vážená paní, Vážený pane,

Na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu Vám bylo lékařem indikováno ODSTRANĚNÍ GENITÁLNÍCH BRADAVIC. Máte nezadatelné právo být před Vaším rozhodnutím o těchto postupech podrobně informován/a.

• **Co jsou genitální bradavice**

Jedná se o sexuálně přenosné, virové onemocnění kůže a sliznic, vyskytující se nejčastěji na genitálu a okolo konečníku. Vzhledem k tomu, že se jedná o virové onemocnění, je nutno zákrok opakovat do doby, než dojde k úplnému vymizení všech bradavic.

• **Princip léčby**

Princip léčby spočívá v odstranění bradavic chirurgickou cestou, a to: abrazí - odstranění ostrou lžičkou nebo excizí - vyříznutím v lokálním znecitlivění (odstraněná tkáň je odeslána k dalšímu laboratornímu vyšetření).

• **Jaké jsou alternativy výkonu:**

Genitální bradavice lze také léčit podáváním lokálně působících přípravků, případně mražením tekutým dusíkem či odstraněním pomocí laseru. Tyto varianty léčby mohou být použity po odstranění bradavic chirurgickou cestou nebo mohou být voleny samostatně. O vhodném postupu léčby s ohledem na Váš zdravotní stav rozhodne ošetřující lékař.

• **Jaký je režim pacienta před výkonem:**

Vždy informujte ošetřujícího lékaře o všech lécích. Pokud užíváte léky ovlivňující srážlivost krve, je nutné vysazení těchto léků několik dnů před plánovaným výkonem, a to dle pokynů Vašeho praktického lékaře! Informujte o alergii na léky, na desinfekční přípravky nebo o skutečnosti, že máte kardiostimulátor! Je nutno před výkonem oholit genitálie (u ambulantních výkonů proveďte prosím doma).

• **Jaké jsou možné komplikace a rizika:**

Krvácení z místa odběru, slabost, mdloba, pokles krevního tlaku v důsledku působení znecitlivujících látek nebo alergická reakce po podání těchto látek. Dále, infekce v ráně nebo bolestivost v ráně a jejím okolí. V případě komplikací neprodleně informujte svého lékaře, dostavte se na pohotovost!

Pozdní komplikace - vyskytují se řádově v měsících až letech po provedení výkonu (bolest v jizvě a okolí, nevzhledná jizva (keloid), píštěl v jizvě, barevné změny v jizvě nebo znovu objevení se bradavic

• **Jaký je režim pacienta po provedení výkonu:**

Po výkonu odcházíte domů, nejlépe s doprovodem. Kontroly hojení probíhají ambulantně, určí je lékař, který Vás rovněž poučí o dalších případných opatřeních a postupech. K předcházení pozdním komplikacím může značnou měrou přispět sám pacient správným dodržováním všech hygienických a režimových opatření doporučených zdravotnickým personálem.


razítko a podpis indikujícího lékaře

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, následky i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Dále mi byly vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měl/a jsem možnost zeptat se lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá a obdržel/a jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměl/a. S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím.

Bylo mi podáno vysvětlení, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších výkonů nutných k záchraně mého života nebo zdraví, budou tyto výkony provedeny.

Identifikační údaje pacienta:

V Krnově dne:

| | | |
|--------|--------------|--|
| Jméno: | Rodné číslo: | Podpis: |
| | |  |

Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka:

| | | |
|--------|--------------|---------|
| Jméno: | Rodné číslo: | Podpis: |
| | | |

Stav pacienta před propuštěním:

- při vědomí
 bez krvácení
 poučen/a o režimu

Podpis lékaře, který propouští pacienta do domácí péče: