

## PRIAPISMUS – bolestivá erekce

### Vážený pane,

Na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu Vám byla lékařem indikována léčba bolestivé erekce. Máte nezadatelné právo být před Vaším rozhodnutím o těchto postupech podrobně informován.

#### – Co je priapismus a jaký je důvod (indikace) léčby:

**Priapismus** je označení pro poměrně vzácný stav přetrvávající bolestivé erekce, obvykle bez předchozích erotických podnětů. Základem léčby je snaha o záchranu ischemické tkáně. První pomocí je chlazení ledovou tříští. Přetrvá-li priapismus déle než přibližně 24 hodin, vede k nevratnému poškození topořivých těles a k neschopnosti erekce. Arteriální priapismus má prognózu příznivější, protože při něm není výrazněji narušena výživa tkání.

#### – Jaký je režim pacienta před výkonem:

Ošetřujícího lékaře musíte informovat o stavech, které zvyšují rizika případné operace. Jsou to alergie, krevní choroby, poruchy srážlivosti krve, závažné interní choroby, infekční choroby včetně AIDS, užívané léky, zejména preparáty snižující srážlivost krve. Oholení operačního místa.

#### – Jaký je postup při provádění výkonu:

Operace se provádí v celkové nebo spinální anestezii a trvá asi 30 minut. Prvním výkonem je punkce topořivých těles s odsáváním krve, popř. s aplikací adrenalinu nebo metylénové modři. V případě selhání je na místě operační řešení. Operace má za úkol odvést krev z penisu. Máme k dispozici tři možnosti vytvoření komunikace mezi:

- topořivými tělesy a žaludem
- topořivými tělesy a tělesem močové trubice
- topořivými tělesy a žilou odvádějící krev z nohou

#### – Jaké jsou možné komplikace:

Jako každý operační výkon má i tento své komplikace:

- recidiva přeplnění kavernózních těles
- krvácení, otok, změna kvality erekce
- infekční komplikace (infekce rány, teploty)
- zúžení zevního ústí močové trubice

K těmto komplikacím přistupujeme s preventivními opatřeními a při výskytu se dají řešit!

#### • Jaký je režim pacienta po provedení výkonu:

V nemocnici budete hospitalizován asi 2-4 dny. První den je vhodný klidový režim na lůžku, budou Vám podávány léky na tlumení bolesti. Sprchování je možno od 5. dne od operace, bez použití mýdla. Stehy se rozpustí a vypadnou samy. Pohlavní život je možno obnovit po první kontrole v urologické ambulanci.

**razítko a podpis indikujícího lékaře**

**Prohlašuji**, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, následky i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Dále mi byly vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měl jsem možnost zeptat se lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá, a obdržel jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměl. S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím.

Bylo mi podáno vysvětlení, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších výkonů nutných k záchraně mého života nebo zdraví, budou tyto výkony provedeny.

#### Identifikační údaje pacienta:

#### V Krnově dne:

Jméno:	Rodné číslo:	Podpis:

#### Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka:

Jméno:	Rodné číslo:	Podpis: