

Informační leták o invazivním výkonu

Název výkonu: **kladívkový prst – sectio Hohmann**

Vzhledem k tomu, že jste se rozhodl/a podstoupit invazivní výkon operaci kladívkového prstu, přečtěte si prosím následné poučení o způsobu provedení, případných rizicích a alternativách daného výkonu. Přečtení tohoto letáku nenahrazuje rozhovor s ošetřujícím, resp. zákrok provádějícím, lékařem, který zodpoví veškeré Vaše dotazy.

1. Účel zákroku

Kladívkový prst je deformita, kdy dochází k ohnutí v základním kloubu prstu do pravého úhlu, v distálním kloubu pak může být rovněž lehké ohnutí nebo až mírná hyperextenze (nadměrné narovnání). Nad hlavičkou základního článku se tlakem v obuvi vytváří bolestivý mozol až kuří oko. Nejčastěji bývá postižen 2., 3., 4. prst, deformita se však může vyskytnout i na palci a malíku. Účelem operačního zákroku je korekce zmíněného ohnutí a odstranění přidružených bolestivých kožních afekcí.

2. Povaha zákroku

Operuje se v lokální anestezii (operátor opíchne místo zákroku umrtvující látkou na operačním sále). Z malého kožního řezu se odstraňují otlaky a resekuje se část kosti základního článku prstu čím dochází ke korekci ohnutí. Během jedné operace se odstraňují všechny kladívkovité prsty.

3. Důsledky zákroku

Předpokládaná doba hospitalizace při nekomplikovaném průběhu jsou tři dny. Ihned po operaci možno vstávat a začít plně zatěžovat operovanou končetinu. Vytažení stehů provádíme ambulantně 10. – 13. pooperační den. Zákrok je minimálně bolestivý, v případě potřeby jsou aplikována předepsaná analgetika.

4. Rizika a komplikace

Jsou minimální. Při nedostatečné resekcii může dojít k recidivě deformity, kdy nutno reoperovat.

5. Alternativy zákroku

Konzervativní léčba je pouze paliativní a spočívá v přikládání ochranných plstěných či náplastových kroužků nad prominující kloub. U nemocných, u kterých je operace z různých důvodů kontraindikována, doporučujeme nošení prostorné obuvi, nebo se předepisuje ortopedická obuv.